

## Akibat Jika Fraktur Tidak Mendapatkan Penanganan dengan Benar

- Tulang **tidak tersambung**
- **Infeksi** pada tulang yang terbuka
- Tulang sembuh dalam posisi tidak sesuai (**bengkok**)
- Anggota gerak (tangan dan kaki) **dapat membusuk** sehingga harus di amputasi.



Volkmann's contracture, (tangan menjadi kaku, mengecil dan tidak berfungsi)



Khaki membiru dan membusuk karena penanganan tidak baik (harus diamputasi)

## Apa yang Harus Dilakukan Setelah Pasien Pulang?

- **Kontrol** teratur ke poliklinik Orthopaedi.
- **Minum obat** sesuai anjuran dokter.
- **Latihan** gerakan pada sendi sesuai instruksi dokter dan fisioterapis
- **Cegah infeksi** dengan menjaga kebersihan tubuh
- Segera kembali ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) **bila** timbul kebiruan, dingin, kesemutan hebat, bengkak dan nyeri pada organ atau bagian yang dipasang gips

Untuk keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi:



Departemen Orthopaedi  
dan Traumatologi  
FK UGM – RSUP dr. Sardjito  
Jl.Kesehatan No.1 Sekip Yogyakarta,  
(0274) 515054  
email : orthougma@indo.net.id

SEMOGA LEKAS SEMBUH

RSUP Dr. SARDJITO - YOGYAKARTA  
*"Mitra Terpercaya Menuju Sehat"*



KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN  
RSUP Dr. SARDJITO



# PATAH TULANG

UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (UPKRS)  
RSUP Dr. SARDJITO

Jl. Kesehatan No. 1 Sekip, Bulaksumur, Yogyakarta 55284  
Telp. (0274) 587832 / 587333 / 631190 ext. 359  
Email : pkrs.sardjitohospital@gmail.com

## Apa itu fraktur/ Patah tulang?



Fraktur (patah tulang) adalah terputusnya kontinuitas tulang, yang sering disebabkan oleh:

- **Trauma energy tinggi**, seringkali terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas. Contoh : Pengendara sepeda motor dibawah umur



- **Trauma energy rendah**, paling sering terjadi pada orang lanjut usia karena menurunnya kepadatan tulang.



## Tanda dan Gejala Fraktur

- **Perubahan bentuk** pada daerah terlibat fraktur (deformitas)
- Anggota gerak yang patah menjadi **nyeri dan tidak stabil**
- Bunyi **gemerisik seperti batu yang bergeser** bila fraktur digerakkan (**kreпитasi**)
- Adanya **riwayat benturan** atau kecelakaan

## Apa yang Harus Anda Lakukan Bila Mengalami Fraktur?

- **Pertahankan posisi** jangan sampai terjadi pergerakan( pasang bidai ).
- Jika patah tulang menembus kulit, **tutup dengan pembalut bersih (steril)**.
- **Segera bawa ke rumah sakit terdekat.**
- **Jangan dibawa ke Pengobatan alternatif**



**Segera bawa penderita fraktur  
ke rumahsakit terdekat**



## Tindakan di Rumah Sakit

Tindakan di rumah sakit sangat **bergantung dari lokasi dan keparahan fraktur**:

### A. Non Operatif (Tanpa Operasi):

- Reposisi dan immobilisasi dengan gips.



**TIDAK SEMUA  
KASUS FRAKTUR  
MEMBUTUHKAN  
TINDAKAN OPERASI**

### B. Operatif

- ☒ Pemasangan implant dilakukan pada fraktur yang tidak stabil (bergerak /bergeser dari posisinya) atau pada daerah tertentu seperti sendi.

**SEBELUM**

**SESUDAH**

