

**TINDAKAN YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN**

- Gunakan obat sesuai anjuran dalam resep
- Tempatkan kasa di atas daerah pencabutan digigit selama 30 menit, bisa diulangi 2-3x atau sampai pendarahan berhenti.
- Lakukan kompres es pada wajah untuk mengurangi pembekakan dengan menggunakan kantung plastik kecil diisi potongan es. Pengompresan dilakukan dengan selang 30 menit dilepas, Dilakukan hanya pada 24 jam pertama.
- Lakukan sikat gigi seperti biasa. Gunakan obat kumur secara perlahan, hindari gerakan berkumur yang terlalu keras. Jangan menghisap hisap daerah bekas pencabutan.
- Makanlah yang lunak-lunak dahulu & minum yang cukup. Dehidrasi akan mengakibatkan peningkatan suhu tubuh. Hindari makanan & minuman yang panas atau pedas.
- Istirahat yang cukup. Waktu penyembuhan akan lebih cepat. Hindari kerja yang terlalu berat 48 jam pertama. Jangan mengunyah permen karet atau merokok.

**SEMOGA LEKAS SEMBUH****RSUP Dr. SARDJITO - YOGYAKARTA***"Mitra Terpercaya Menuju Sehat"*

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN**  
**RSUP Dr. SARDJITO**



# **PENCABUTAN**

# **GIGI IMPAKSI**

# **ODONTEKTOMI**

**UNIT PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (UPKRS)**  
**RSUP Dr. SARDJITO**


Jl. Kesehatan No. 1 Sekip, Bulaksumur, Yogyakarta 55284

Telp. (0274) 587832 / 587333 / 631190 ext. 359

Email : [pkrs.sardjitohospital@gmail.com](mailto:pkrs.sardjitohospital@gmail.com)

## APA YANG DIMAKSUD DENGAN GIGI IMPAKSI?

Impaksi adalah gigi yang jalan erupsi normalnya terhalang atau terblokir, biasanya oleh gigi didekatnya atau jaringan patologis. Impaksi diperkirakan secara klinis apabila gigi antagonisnya sudah erupsi & hampir bisa dipastikan apabila gigi yang terletak pada sisi yang lain sudah erupsi.



## INDIKASI PENGAMBILAN GIGI IMPAKSI

- Pencegahan dan terjadinya infeksi karena/erupsi yang terlambat & abnormal (perikoronitis), serta pencegahan berkembangnya folikel menjadi keadaan patologis (kista odontogenik & neoplasma).
- Usia muda, sesudah akar gigi terbentuk sepertiga sampai dua pertiga bagian & sebelum pasien mencapai usia 18 tahun.
- Adanya infeksi / keadaan patologi.
- Penyimpangan panjang lengkung rahang & untuk membantu mempertahankan stabilitas hasil perawatan ortodonti.
- Prostetik atau restoratif
- Apabila molar kedua di dekatnya dicabut & kemungkinan erupsi normal atau berfungsinya molar ketiga impaksi sangat kecil.
- Secara umum, sebelum tulang menjadi sangat termineralisasi & padat yaitu sebelum usia 26 tahun.

## KONDISI YANG BISA TERJADI SESUDAH PENGAMBILAN GIGI IMPAKSI

### - Rasa Sakit

Rasa sakit & tidak nyaman mencapai puncaknya pada waktu kembalinya sensasi atau ketika reaksi obat bius telah habis. Untuk mengurangi rasa sakit tersebut, minumlah obat pengontrol sakit sebelum timbulnya rasa tidak nyaman tersebut.

### - Perdarahan

Perdarahan ringan biasa terjadi pada 24 jam pertama. Perdarahan paling baik dikontrol dengan menggunakan penekanan.

### - Pembengkakan

Pembengkakan mencapai puncaknya kurang lebih 24 jam sesudah pembedahan. Kondisi ini bisa berlangsung sampai 1 minggu.